

Nazwa i postać produktu leczniczego	Kolor wieczka fiołki	Dawka	Objętość wstrzyknięcia na dawkę	Rozcieńczenie	Ilość rozcieńczalnika potrzebna na fiołkę*	Liczba dawek w fiołce	Objętość napełniania na fiołkę	Zamrażarka o bardzo niskiej temperaturze (ULT) (od -90°C do -60°C)	Czas przechowywania w zamrażarce (od -25°C do -15°C)	Czas przechowywania w lodówce (od 2°C do 8°C)	Temperatura pokojowa (od 8°C do 30°C)	Po pierwszym przekłuciu (od 2°C do 30°C)
Comirnaty 30 mikrogramów/dawkę koncentrat do sporządzania dyspersji do wstrzykiwań Osoby w wieku od 12 lat Postać do rozcieńczenia przed użyciem	Fioletowy 	30 µg	0,3 ml	Wymagane rozcieńczenie	1,8 ml	6 dawek w fiołce (po rozcieńczeniu)	0,45 ml	15 miesięcy (okres ważności)	2 tygodnie	1 miesiąc	2 godziny przed rozcieńczeniem (włącznie z czasem rozmrażania)	Wyrzucić po 6 godzinach
Original/Omicron BA.1 (15/15 mikrogramów)/dawkę dyspersja do wstrzykiwań Osoby w wieku od 12 lat; Postać gotowa do użycia	Szary Original/Omicron BA.1 TYLKO DAWKA PRZYPOMINAJĄCA 	15 µg tozinameranu i 15 µg riltozinameranu	0,3 ml	BEZ ROZCIEŃCZANIA	BEZ ROZCIEŃCZANIA	6 dawek w fiołce	2,25 ml	18 miesięcy (okres ważności)	NIE PRZECHOWYWAĆ	10 tygodni	12 godzin przed pierwszym przekłuciem (włącznie z czasem rozmrażania)	Wyrzucić po 12 godzinach
Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogramów)/dawkę dyspersja do wstrzykiwań Osoby w wieku od 12 lat; Postać gotowa do użycia	Szary Original/Omicron BA.45 TYLKO DAWKA PRZYPOMINAJĄCA 	15 µg tozinameranu i 15 µg famtozinameranu	0,3 ml	BEZ ROZCIEŃCZANIA	BEZ ROZCIEŃCZANIA	6 dawek w fiołce	2,25 ml	18 miesięcy (okres ważności)	NIE PRZECHOWYWAĆ	10 tygodni	12 godzin przed pierwszym przekłuciem (włącznie z czasem rozmrażania)	Wyrzucić po 12 godzinach
Comirnaty 10 mikrogramów/dawkę koncentrat do sporządzania dyspersji do wstrzykiwań Dzieci w wieku od 5 do 11 lat; Postać do rozcieńczenia przed użyciem	Pomarańczowy 	10 µg	0,2 ml	Wymagane rozcieńczenie	1,3 ml	10 dawek w fiołce (po rozcieńczeniu)	1,3 ml	18 miesięcy (okres ważności)	NIE PRZECHOWYWAĆ	10 tygodni	12 godzin przed rozcieńczeniem (włącznie z czasem rozmrażania)	Wyrzucić po 12 godzinach
Original/Omicron BA.4-5 (5/5 mikrogramów)/dawkę koncentrat do sporządzania dyspersji do wstrzykiwań Dzieci w wieku od 5 do 11 lat; Postać do rozcieńczenia przed użyciem	Pomarańczowy Original/Omicron BA.45 TYLKO DAWKA PRZYPOMINAJĄCA 	5 µg tozinameranu i 5 µg famtozinameranu	0,2 ml	Wymagane rozcieńczenie	1,3 ml	10 dawek w fiołce (po rozcieńczeniu)	1,3 ml	18 miesięcy (okres ważności)	NIE PRZECHOWYWAĆ	10 tygodni	12 godzin przed rozcieńczeniem (włącznie z czasem rozmrażania)	Wyrzucić po 12 godzinach
Comirnaty mikrogramy/dawkę koncentrat do sporządzania dyspersji do wstrzykiwań Dzieci w wieku od 6 miesięcy do 4 lat; Postać do rozcieńczenia przed użyciem	Kasztanowy 	3 µg	0,2 ml	Wymagane rozcieńczenie	2,2 ml	10 dawek w fiołce (po rozcieńczeniu)	0,4 ml	18 miesięcy (okres ważności)	NIE PRZECHOWYWAĆ	10 tygodni	12 godzin przed rozcieńczeniem (włącznie z czasem rozmrażania)	Wyrzucić po 12 godzinach