


Kalendarze szczepień dorosłych Polskiego Towarzystwa Wakcynologii

Opracowanie zbiorcze
19.03.2024



<https://ptwakc.org.pl/szczepienia-doroslych/>

Szczepionka przeciw	Wiek (lata)					wszyscy dorośli w zależności od wieku		
	19 - 26	27 - 49	50 - 59	60 - 64	>65			
Grypie (IIV)	1 co roku, w czasie sezonu infekcyjnego (najlepiej na początku sezonu) dla osób w wieku ≥60 lat zalecana szczepionka wysokodawkowa							
Błonicy, tężcowi, krztuścowi (Tdap)	1 dawka co 10 lat (osoby wcześniej zaszczepione w schemacie podstawowym)							
Ospie wietrznej (VZV)	2 dawki (osoby, które nie chorowały na ospę wietrzną i nie były szczepione)							
Odrze, śwince, różyczce (MMR)	2 dawki (osoby, które nie chorowały na odrę lub różyczkę i nie były szczepione)							
Covid-19	Liczba dawek zależy od historii szczepień i aktualnych zaleceń							
Wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (HBV)	3 dawki (osoby wcześniej nieszczepione)							
Ludzkiemu wirusowi brodawczaka (HPV)	3 dawki	3 dawki (decyzja o szczepieniu po rozmowie z lekarzem na temat korzyści ze szczepienia)						
Pneumokokom (PCV, PPSV)				1 dawka PCV-13 lub PCV-20	1 dawka PCV-13 lub PCV-20	1 dawka PCV-13 + PPSV-23 lub 1 dawka PCV-20		
Półpaścowi (RZV)				2 dawki w odstępie 2 - 6 miesięcy				
Syncytialnemu wirusowi oddechowemu (RSV)				1 dawka				
Kleszczowemu zapaleniu mózgu (KZM)	3 dawki + dawki przypominające co 3-5 lat							
Wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (HAV)	2 dawki (osoby, które nie były wcześniej szczepione)							
Meningokokom (MenB, MenACWY)	MenB - 2 dawki, MenACWY - 1 dawka							

IIV - szczepionka przeciw grypie, inaktywowana; Tdap - szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi z obniżoną zawartością antygenów krztuśca i błonicy; VZV - szczepionka przeciw ospie wietrznej; MMR - szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce; Covid-19 - szczepionka przeciw Covid-19; HBV (Hepatitis B Vaccine) - szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B; HPV - szczepionka przeciw ludzkiemu wirusowi brodawczaka; PCV - skoniugowana szczepionka przeciw pneumokokom; PPSV - polisacharydowa szczepionka przeciw pneumokokom; RZV - szczepionka przeciw półpaścowi; RSV - szczepionka przeciw syncytialnemu wirusowi oddechowemu; KZM - szczepionka przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu; HAV (Hepatitis A Vaccine) - szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A; MenB - szczepionka przeciw meningokokom grupy B; MenACWY - szczepionka przeciw meningokokom grupy A, C, W135, Y.

szczepienia zalecane dla wszystkich nieuodpornionych osób w tym wieku, szczepienia zalecane, gdy występują dodatkowe czynniki ryzyka (np. medyczne, zawodowe, związane ze stylem życia).

19.03.2024

Szczepionka przeciw	Wiek (lata)			osoby starsze
	50 - 59	60 - 64	>65	
Grypie (IIV)	1 co roku, w czasie sezonu infekcyjnego (najlepiej na początku sezonu) dla osób w wieku ≥ 60 lat zalecana szczepionka wysokodawkowa			
Błonicy, tężcowi, krztuścowi (Tdap)	1 dawka co 10 lat (osoby wcześniej zaszczepione w schemacie podstawowym)			
Covid-19	Liczba dawek zależy od historii szczepień i aktualnych zaleceń			
Wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (HBV)	3 dawki (osoby, które nie były wcześniej zaszczepione)			
Pneumokokom (PCV, PPSV)	1 dawka PCV-13 lub PCV-20	1 dawka PCV-13 lub PCV-20	1 dawka PCV-13 + PPSV-23 lub 1 dawka PCV-20	
Półpaścowi (RZV)	2 dawki w odstępie 2 – 6 miesięcy			
Syncytialnemu wirusowi oddechowemu (RSV)	1 dawka			
Kleszczowemu zapaleniu mózgu (KZM)	3 dawki + dawka przypominająca co 3 - 5 lat			
Wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (HAV)	2 dawki (osoby, które nie były wcześniej zaszczepione)			
Meningokokom (MenB, MenACWY)	MenB - 2 dawki MenACWY - 1 dawka			

IIV - szczepionka przeciw grypie, inaktywowana; Tdap - szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi; Covid-19 - szczepionka przeciw Covid-19; HBV (Hepatitis B Vaccine) - szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B; PCV - skoniugowana szczepionka przeciw pneumokokom; PPSV - polisacharydowa szczepionka przeciw pneumokokom; RZV - szczepionka przeciw półpaścowi; RSV - szczepionka przeciw syncytialnemu wirusowi oddechowemu; VZV - szczepionka przeciw ospie wietrznej; MMR - szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce; KZM - szczepionka przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu; HAV (Hepatitis A Vaccine) - szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A; MenB - szczepionka przeciw meningokokom grupy B; MenACWY - szczepionka przeciw meningokokom grupy A, C, W, Y.

 szczepienia zalecane dla wszystkich nieuodpornionych osób w tym wieku,
 szczepienia zalecane, gdy występują dodatkowe czynniki ryzyka (np. medyczne, zawodowe, związane ze stylem życia).

Szczepionka przeciw	Schemat szczepienia	przed ciążą
Wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (HBV)	3 dawki (kobiety, które nie były wcześniej szczepione)	
Ospie wietrznej (VZV)*	2 dawki (kobiety, które nie chorowały na ospę wietrzną i nie były szczepione)	
Odrze, śwince, różyczce (MMR)*	1 lub 2 dawki (kobiety, które nie chorowały na różyczkę i nie były szczepione)	
Grypie (IIV)	1 dawka na początku lub w trakcie sezonu epidemicznego	

Szczepionka przeciw	Schemat szczepienia	w ciąży
Grypie (IIV)	1 dawka, może być podana w każdym okresie ciąży	
Błonicy, tężcowi, krztuścowi (Tdap)	1 dawka w każdej ciąży, może być podana między 27 a 36 tc. (optymalnie między 28 a 32 tc.)	
Covid-19	1 dawka (zgodnie z aktualnymi zaleceniami)	
Syncytialnemu wirusowi oddechowemu (RSV)	1 dawka, może być podana między 24. a 36. tc., zapewnia ochronę dziecka w pierwszych 6 miesiącach życia	

*szczepienie zakończone nie później niż miesiąc przed zajściem w ciążę.

IIV - szczepionka przeciw grypie, inaktywowana; Tdap - szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi z obniżoną zawartością składnika błonicy i krztuśca; Covid-19 - szczepionka przeciw Covid-19; RSV - szczepionka przeciw syncytialnemu wirusowi oddechowemu; HBV (Hepatitis B Vaccine) - szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B; VZV - szczepionka przeciw ospie wietrznej; MMR - szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce.



Szczepionka przeciw	Schemat szczepienia	pacjenci z chorobami układu oddechowego	
Grypie (IIV)	1 dawka co roku, w czasie sezonu infekcyjnego (najlepiej na początku sezonu) dla osób w wieku ≥ 60 lat zalecana szczepionka wysokodawkowa		
Pneumokokom (PCV, PPSV)	1 dawka PCV-13 + 1 dawka PPSV-23 (z zachowaniem odstępu ≥ 8 tygodni) lub 1 dawka PCV-20		
Błonicy, tężcowi, krztuścowi (Tdap)	1 dawka co 10 lat (osoba zaszczepiona w przeszłości w schemacie podstawowym)		
Covid-19	Liczba dawek zależy od historii szczepień i aktualnych zaleceń		
Syncytialnemu wirusowi oddechowemu (RSV)	1 dawka, osoby w wieku ≥ 60 lat		
Półpaścowi (RZV)	2 dawki w odstępie 2-6 miesięcy		

IIV - szczepionka przeciw grypie, inaktywowana; PCV - skoniugowana szczepionka przeciw pneumokokom; PPSV – polisacharydowa szczepionka przeciw pneumokokom; Tdap - szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi ze zmniejszoną zawartością antygenów krztuśca i błonicy; Covid-19 – szczepionka przeciw Covid-19; RSV – szczepionka przeciw syncytialnemu wirusowi oddechowemu; RZV- szczepionka przeciw półpaścowi.



Szczepienia zalecane dla wszystkich nieuodpornionych dorosłych wymieniono w KALENDARZU SZCZEPIEŃ DOROSŁYCH.

19.03.2024

Szczepionka przeciw	Schemat szczepienia	pacjenci z chorobami układu sercowo-naczyniowego
Grypie (IIV)	1 dawka co roku, w czasie sezonu infekcyjnego (najlepiej na początku sezonu) dla osób w wieku ≥ 60 lat zalecana szczepionka wysokodawkowa	
Pneumokokom (PCV, PPSV)	1 dawka PCV-13 + 1 dawka PPSV-23 (z zachowaniem odstępu ≥ 8 tygodni) lub 1 dawka PCV-20	
Błonicy, tężcowi, krztuścowi (Tdap)	1 dawka co 10 lat (osoba zaszczepiona w przeszłości w schemacie podstawowym)	
Covid-19	Liczba dawek zależy od historii szczepień i aktualnych zaleceń	
Syncytialnemu wirusowi oddechowemu (RSV)	1 dawka, osoby w wieku ≥ 60 lat	
Półpaścowi (RZV)	2 dawki w odstępie 2-6 miesięcy	

IIV - szczepionka przeciw grypie, inaktywowana; PCV - skoniugowana szczepionka przeciw pneumokokom; PPSV – polisacharydowa szczepionka przeciw pneumokokom; Tdap - szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi ze zmniejszoną zawartością antygenów krztuśca i błonicy; Covid-19 – szczepionka przeciw Covid-19; RSV – szczepionka przeciw syncytialnemu wirusowi oddechowemu; RZV- szczepionka przeciw półpaścowi.



Szczepienia zalecane dla wszystkich nieuodpornionych dorosłych wymieniono w KALENDARZU SZCZEPIEŃ DOROSŁYCH.

Szczepionka przeciw	Schemat szczepienia	pacjenci z przewlekłą chorobą nerek
Wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (HBV)	4 dawki (osoby, które nie były wcześniej szczepione), dodatkowo ocena odporności poszczepiennej	
Grypie (IIV)	1 dawka co roku, w czasie sezonu infekcyjnego (najlepiej na początku sezonu) dla osób w wieku ≥ 60 lat zalecana szczepionka wysokodawkowa	
Pneumokokom (PCV, PPSV)	1 dawka PCV-13 + 1 dawka PPSV-23 (w odstępie ≥ 8 tygodni) lub 1 dawka PCV-20	
Błonicy, tężcowi, krztuścowi (Tdap)	1 dawka co 10 lat (osoba zaszczepiona w przeszłości w schemacie podstawowym)	
Covid-19	Liczba dawek zależy od historii szczepień i aktualnych zaleceń	
Półpaścowi (RZV)	2 dawki w odstępie 2 – 6 miesięcy	
Syncytialnemu wirusowi oddechowemu (RSV)	1 dawka (u osób w wieku ≥ 60 lat)	



IIV - szczepionka przeciw grypie, inaktywowana; PCV - skoniugowana szczepionka przeciw pneumokokom; PPSV – polisacharydowa szczepionka przeciw pneumokokom; HBV (Hepatitis B Vaccine) - szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B; Tdap - szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi z obniżoną zawartością antygenów błonicy i krztuśca; Covid-19 – szczepionka przeciw Covid-19; VZV- szczepionka przeciw ospie wietrznej; MMR- szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce; RZV- szczepionka przeciw półpaścowi.

Szczepienia zalecane dla wszystkich nieuodpornionych dorosłych wymieniono w KALENDARZU SZCZEPIEŃ DOROSŁYCH.

Szczepionka przeciw	Schemat szczepienia	pacjenci z przewlekłą chorobą wątroby	
Wirusowemu zapaleniu wątroby typu B*	3 dawki w schemacie 0, 1, 6 miesięcy		
Wirusowemu zapaleniu wątroby typu A	2 dawki w odstępie 6-12 miesięcy		
Grypie (IIV)	1 dawka co roku, w czasie sezonu infekcyjnego (najlepiej na początku sezonu) dla osób w wieku ≥60 lat zalecana szczepionka wysokodawkowa		
COVID-19	Liczba dawek zależna od historii szczepień i aktualnych zaleceń		
Pneumokokom (PCV, PPSV)	1 dawka PCV-13 + 1 dawka PPSV-23 (w odstępie ≥8 tygodni) lub 1 dawka PCV-20		
Błonicy, tężcowi, krztuścowi (Tdap)	1 dawka co 10 lat (osoba zaszczepiona w przeszłości w schemacie podstawowym)		
Meningokokom (MenB, MenACWY)	MenB: 2 dawki w odstępie 1 miesiąca (Bexsero) 2 dawki w odstępie 6 miesięcy lub 3 dawki w schemacie 0, 1, 4 miesiące (Trumenba)	MenACWY 1 dawka	
Półpaścowi (RZV)	2 dawki w odstępie 2-6 miesięcy		
Syncytialnemu wirusowi oddechowemu (RSV)	1 dawka (u osób w wieku ≥60 lat)		

*dla osób zakażonych wirusem zapalenia wątroby typu C szczepionki obowiązkowe, bezpłatne, dostępne za pośrednictwem stacji sanitarno-epidemiologicznych (tak jak w przypadku innych szczepień obowiązkowych); osoby zakażone wirusem zapalenia wątroby typu B nie wymagają szczepienia

HBV (Hepatitis B Vaccine) - szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B; HAV (Hepatitis A Vaccine) - szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A; IIV - szczepionka przeciw grypie, inaktywowana; PCV - skoniugowana szczepionka przeciw pneumokokom; PPSV - polisacharydowa szczepionka przeciw pneumokokom; Tdap - szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi; Covid-19 - szczepionka przeciw Covid-19; MenB - szczepionka przeciw meningokokom serogrupy B; MenACWY - szczepionka przeciw meningokokom serogrupy A, C, W135, Y; VZV - szczepionka przeciw ospie wietrznej; MMR - szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce; RZV - szczepionka przeciw półpaścowi; RSV - szczepionka przeciw syncytialnemu wirusowi oddechowemu.

Szczepionka przeciw	Schemat szczepienia	pacjenci z cukrzycą	
Grypie (IIV)	1 dawka co roku, w czasie sezonu infekcyjnego (najlepiej na początku sezonu) dla osób w wieku ≥ 60 lat zalecana szczepionka wysokodawkowa		
Pneumokokom (PCV, PPSV)	1 dawka PCV-13 + 1 dawka PPSV-23 (z zachowaniem odstępu ≥ 8 tygodni) lub 1 dawka PCV-20		
Wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (HBV)	3 dawki (osoby, które nie były wcześniej szczepione)		
Błonicy, tężcowi, krztuścowi (Tdap)	1 dawka co 10 lat (osoby wcześniej zaszczepione w schemacie podstawowym)		
Covid-19	Liczba dawek zależy od historii szczepień i aktualnych zaleceń		
Syncytialnemu wirusowi oddechowemu (RSV)	1 dawka, osoby w wieku ≥ 60 lat		
Półpaścowi (RZV)	2 dawki w odstępie 2 - 6 miesięcy		




IIV - szczepionka przeciw grypie, inaktywowana; PCV - skoniugowana szczepionka przeciw pneumokokom; PPSV – polisacharydowa szczepionka przeciw pneumokokom; Tdap - szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi ze zmniejszoną zawartością antygenów krztuśca i błonicy; Covid-19 – szczepionka przeciw Covid-19; HBV (Hepatitis B Vaccine) - szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B; RSV - szczepionka przeciw syncytialnemu wirusowi oddechowemu; RZV - szczepionka przeciw półpaścowi.

Szczepienia zalecane dla wszystkich nieuodpornionych dorosłych wymieniono w KALENDARZU SZCZEPIEŃ DOROSŁYCH.

19.03.2024

Szczepionka przeciw	Pacjenci dorośli z asplenią lub dysfunkcją śledziony
Pneumokokom (PCV, PPSV)*	1 dawka PCV-13 + 1 dawka PPSV-23 (z zachowaniem odstępu ≥ 8 tygodni) lub 1 dawka PCV-20
Meningokokom (MenB, MenACWY)	MenB 2 dawki w odstępie 1 miesiąca (Bexsero) 3 dawki: 2. dawka po miesiącu po dawce 1., 3. dawka po 4 miesiącach po dawce 2 (Trumenba)
	MenACWY 2 dawki w odstępie 8 tygodni, dawki przypominające co 5 lat
Haemophilus influenzae typu b (Hib)*	1 dawka
Błonicy, tężcowi, krztuścowi (Tdap)*	1 dawka Tdap co 10 lat (osoba zaszczepiona w przeszłości w schemacie podstawowym) 1 dawka Tdap + 2 dawki Td + 1 dawka Tdap co 10 lat (osoba bez dokumentacji szczepień)
Odrze, śwince i różyczkę (MMR)*	2 dawki (osoba, która nie chorowała na odrę lub różyczkę i nie była szczepiona)
Wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (HBV)*	3 dawki (osoba, która nie była wcześniej szczepiona)
Grypie (IIV)	1 dawka co roku, w czasie sezonu infekcyjnego (najlepiej na początku sezonu) dla osób w wieku ≥ 60 lat zalecana szczepionka wysokodawkowa
Covid-19	Liczba dawek zależy od historii szczepień i aktualnych zaleceń
Półpaścowi (RZV)	2 dawki w odstępie 2-6 miesięcy



PCV - skoniugowana szczepionka przeciw pneumokokom; PPSV - polisacharydowa szczepionka przeciw pneumokokom; MenB - szczepionka przeciw meningokokom grupy B; MCV-4 - szczepionka przeciw meningokokom grupy A, C, W, Y lub C; Hib - szczepionka przeciw zakażeniom Haemophilus influenzae typu b; Tdap- szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi ze zmniejszoną zawartością antygenów krztuśca i błonicy; MMR- szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce; HBV (Hepatitis B Vaccine) - szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B; IIV - szczepionka przeciw grypie, inaktywowana; Covid-19 - szczepionka przeciw Covid-19; RZV- szczepionka przeciw półpaścowi.

Szczepionka przeciw	Schemat szczepienia	pacjenci z zaburzeniami odporności* (z wyłączeniem pacjentów zakażonych HIV)	
Grypie (IIV)	1 dawka co roku, w czasie sezonu infekcyjnego (najlepiej na początku sezonu) dla osób w wieku ≥60 lat zalecana szczepionka wysokodawkowa		
COVID-19	Liczba dawek zależna od historii szczepień i aktualnych zaleceń		
Błonicy, tężcowi, krztuścowi (Tdap)	1 dawka co 10 lat (osoba zaszczepiona w przeszłości w schemacie podstawowym)		
Pneumokokom (PCV, PPSV)	1 dawka PCV-13 + 1 dawka PPSV-23 (w odstępie ≥8 tygodni) lub 1 dawka PCV-20		
Inwazyjnej Chorobie Meningokokowej (MenB, MenACWY)	MenB 2 dawki w odstępie 1 miesiąca (Bexsero) 2 dawki w odstępie 6 miesięcy lub 3 dawki w schemacie 0, 1, 4 miesiące (Trumenba); dawka przypominająca po roku oraz kolejne co 2-3 lata		MenACWY 2 dawki; co 5 lat dawka przypominająca
HPV	3 dawki w schemacie 0, 1, 6 (HPV-2); 0, 2, 6 miesięcy (HPV-9)		
Wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (HBV)	3 dawki w schemacie 0, 1, 6 miesięcy, dodatkowo oznaczanie przeciwciał		
Wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (HAV)	2 dawki w odstępie 6-12 miesięcy		
Półpaścowi (RZV)	2 dawki w odstępie 2-6 miesięcy		
Syncytialnemu wirusowi oddechowemu (RSV)	1 dawka (u osób w wieku ≥60 lat)		

*zalecenia dotyczą pacjentów z umiarkowanym i ciężkim pierwotnym lub wtórnym niedoborem odporności

IIV - szczepionka przeciw grypie, inaktywowana; Tdap - szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi; PCV - skoniugowana szczepionka przeciw pneumokokom; PPSV - polisacharydowa szczepionka przeciw pneumokokom; MenB - szczepionka przeciw meningokokom serogrupy B; MenACWY - szczepionka przeciw meningokokom serogrupy A, C, W135, Y; HPV-2 - szczepionka przeciw ludzkiemu wirusowi brodawczaka 2-walentna; HPV-9 - szczepionka przeciw ludzkiemu wirusowi brodawczaka 9-walentna; MMR - szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce; RZV - szczepionka przeciw półpaścowi; RSV - szczepionka przeciw syncytialnemu wirusowi oddechowemu.

Szczepionka przeciw	Schemat szczepień	pacjenci zakażeni HIV
Grypie (IIV)	1 co roku, w czasie sezonu infekcyjnego (najlepiej na początku sezonu) dla osób w wieku ≥60 lat zalecana szczepionka wysokodawkowa	
COVID-19	Liczba dawek zależna od historii szczepień i aktualnych zaleceń	
Błonicy, tężcowi, krztuścowi (Tdap)	1 dawka co 10 lat (osoba zaszczepiona w przeszłości w schemacie podstawowym)	
Pneumokokom (PCV, PPSV)	1 dawka PCV-13 + 1 dawka PPSV-23 (w odstępie ≥8 tygodni) lub 1 dawka PCV-20	
Meningokokom (MenB, MenACWY)*	MenB 2 dawki w odstępie 1 miesiąca (Bexsero) 2 dawki w odstępie 6 miesięcy lub 3 dawki w schemacie 0, 1, 4 miesiące (Trumenba)	MenACWY 1 dawka; co 5 lat dawka przypominająca
HPV	3 dawki w schemacie 0, 1, 6 (HPV-2); 0, 2, 6 miesięcy (HPV-9)	
Wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (HBV)*	3 dawki w schemacie 0, 1, 6 miesięcy	
Wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (HAV)*	2 dawki w odstępie 6-12 miesięcy	
Odrze, śwince, różyczce (MMR)**	2 dawki w odstępie ≥4 tygodni (u osób, które nie chorowały na odrę lub różyczkę i nie były szczepione)	
Ospie wietrznej (VZV)**	2 dawki w odstępie ≥6 tygodni (u osób, które nie chorowały na ospę wietrzną)	
Półpaścowi (RZV)*	2 dawki w odstępie 2-6 miesięcy	
Syncytialnemu wirusowi oddechowemu RSV*	1 dawka (u osób w wieku ≥60 lat)	

IIV - szczepionka przeciw grypie, inaktywowana; Tdap - szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi z obniżoną zawartością antygenów krztuśca i błonicy; PCV - skoniugowana szczepionka przeciw pneumokokom; PPSV - polisacharydowa szczepionka przeciw pneumokokom; MenB - szczepionka przeciw meningokokom serogrupy B; MenACWY - szczepionka przeciw meningokokom serogrupy A, C, W135, Y; HPV-2 - szczepionka przeciw ludzkiemu wirusowi brodawczaka 2-walentna; HPV-9 - szczepionka przeciw ludzkiemu wirusowi brodawczaka 9-walentna; MMR - szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce; RZV - szczepionka przeciw półpaścowi; RSV - szczepionka przeciw syncytialnemu wirusowi oddechowemu.

* jeśli to możliwe, szczepienie powinno być wykonane przy liczbie CD4 >200 kom/ μL.

**szczepienie przeciwwskazane, jeśli liczba CD4 wynosi <200 kom/ μL.

Szczepionka przeciw	Schemat szczepienia	pracownicy ochrony zdrowia
Wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (HBV)	3 dawki (osoby, które nie były wcześniej szczepione)	
Grypie (IIV)	1 dawka co roku, w czasie sezonu infekcyjnego (najlepiej na początku sezonu) dla osób w wieku ≥ 60 lat zalecana szczepionka wysokodawkowa	
Błonicy, tężcowi, krztuścowi (Tdap)	1 dawka co 10 lat (osoba zaszczepiona w przeszłości w schemacie podstawowym)	
COVID-19	Liczba dawek zależy od historii szczepień i aktualnych zaleceń	
Odrze, śwince, różyczce (MMR)	2 dawki (osoby, które nie chorowały na odrę lub różyczkę i nie były szczepione)	
Ospie wietrznej (VZV)	2 dawki (osoby, które nie chorowały na ospę wietrzną i nie były szczepione)	
Meningokom (MenB, MenACWY)	MenB: 2 dawki w odstępie 1 miesiąca (Boxsero) 2 dawki w odstępie 6 miesięcy lub 3 dawki w schemacie 0, 1, 4 miesiące (Trumenba) MenACWY: 1 dawka; co 5 lat dawka przypominająca	
Półpaścowi	2 dawki w odstępie 2-6 miesięcy (osoby w wieku ≥ 50 lat)	
Wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (HAV)	2 dawki w odstępie 6-12 miesięcy	



HBV (Hepatitis B Vaccine) - szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B; wszyscy nieszczepieni powinni dostać 3 dawki szczepionki w schemacie 0-1-6 miesięcy, u osób z grup ryzyka zakażenia zaleca się oznaczenie stężenia przeciwciał anti-HBs nie wcześniej niż 4 tygodnie po podaniu ostatniej dawki; szczepienie bezpłatne. IIV - szczepionka przeciw grypie, inaktywowana; dostępna w ramach refundacji w aptece (50% lub 100%), Covid-19 - szczepionka przeciw Covid-19; szczepienie bezpłatne. MMR - szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce; u osób nieuodpornionych 2 dawki w odstępie 4 tyg.; szczepionka odpłatna. VZV szczepionka przeciw ospie wietrznej; u osób nieuodpornionych 2 dawki; szczepionka odpłatna. Tdap - szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi; zalecane jest podanie pojedynczej dawki przypominającej co 10 lat; szczepionka odpłatna. MenB, MenACWY - szczepionka przeciw meningokokom grupy B oraz szczepionka przeciw meningokokom grupy A, C, W135, Y; zalecane 2 dawki szczepionki MenB w odstępie 4 tyg. oraz 1 dawka MenACWY; szczepionki odpłatne.

Szczepienia zalecane dla wszystkich nieuodpornionych dorosłych wymieniono w KALENDARZU SZCZEPIEŃ DOROSŁYCH.

19.03.2024

Szczepionka przeciw	Wiek (lata)			medycyna podróży
	19 - 49	50 - 64	≥65	
Grypie (IIV)	1 dawka co roku, dla osób w wieku ≥60 lat zalecana szczepionka wysokodawkowa			
Błonicy, tężcowi, krztuścowi (Tdap)	1 dawka co 10 lat (osoba zaszczepiona w przeszłości w schemacie podstawowym) 3 dawki w schemacie 0,1, 6 miesięcy (osoba wcześniej nieszczepiona)			
Odrze (MMR)	2 dawki w odstępie ≥4 tygodni (u osób, które nie chorowały na odrę i nie były szczepione)			
Covid-19	Liczba dawek zależna od historii szczepień i aktualnych zaleceń			
Wirusowemu zapaleniu wątroby typu B	3 dawki (osoby wcześniej nieszczepione)			
Pneumokokom (PCV, PPSV)		1 dawka PCV-13 lub PCV-20	1 dawka PCV-13 + 1 dawka PPSV-23 lub 1 dawka PCV-20	
Kleszczowemu zapaleniu mózgu (KZM)	3 dawki + dawki przypominające co 3-5 lat (osoby, które nie chorowały i nie były szczepione)			
Wirusowemu zapaleniu wątroby typu A	2 dawki (osoby, które nie chorowały i nie były szczepione)			
Meningokokom (MenACWY)	1 dawka			
Poliomyelitis (IPV)	1 dawka przypominająca (osoba zaszczepiona w przeszłości w schemacie podstawowym) 3 dawki (osoba wcześniej nieszczepiona)			
Żółtej gorączce	1 dawka			
Durowi brzuszному	1 dawka (szczepionka inaktywowana) lub 2 dawki (szczepionka żywa)			
Cholerze	2 dawki (szczepionka inaktywowana) lub 1 dawka (szczepionka żywa)			
Japońskiemu zapaleniu mózgu	2 dawki			
Wściekliznie	2 lub 3 dawki			

IIV - szczepionka przeciw grypie, inaktywowana; Tdap - szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi; MMR - szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce; PCV - skoniugowana szczepionka przeciw pneumokokom; PPSV - polisacharydowa szczepionka przeciw pneumokokom; MenACWY - szczepionka przeciw meningokokom serogrupy A, C, W135, Y; IPV - inaktywowana szczepionka przeciw poliomyelitis

Szczepienia zalecane dla wszystkich nieuodpornionych dorosłych wymieniono w KALENDARZU SZCZEPIEŃ DOROSŁYCH.

■ szczepienia zalecane dla wszystkich nieuodpornionych osób w tym wieku
■ szczepienia zalecane w zależności od celu podróży.

19.03.2024